

## CUKRINIO DAIBETO KLINIKINIAI SIMPTOMAI

	SIMPTOMAI
<b>1 TIPO CD</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- troškulys (lot. polydipsia - polidipsija),</li><li>- dažnas ir gausus šlapinimasis (lot. polyuria - poliurija),</li><li>- padidėjęs noras valgyti ir gausesnis maisto suvartojimas (lot. polyfagia - polifagija),</li><li>- svorio mažėjimas,</li><li>- silpnumas, mieguistumas,</li><li>- regėjimo sutrikimai,</li><li>- dažnai nustatoma ketonurija ir (ar) ketoacidozė.</li></ul>
<b>2 TIPO CD</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- dažnesnis ar naktinis šlapinimasis,</li><li>- troškulys ar didesnis apetitas,</li><li>- nuolatinis nuovargis,</li><li>- galūnių tirpimas ar dilgčiojimas,</li><li>- regos sutrikimai, sausa ir niežtinti oda,</li><li>- svorio netekimas,</li><li>- šlapimo takų infekcija,</li><li>- lytinių organų grybelinė infekcija.</li></ul> <p>Sergantysis antrojo tipo CD dažnai simptomų nejaučia, nes liga vystosi palaipsniui ir nepastebimai, 20-50 proc. atvejų diagnozė nustatoma jau išryškėjus cukrinio diabeto komplikacijoms.</p>