

Individualūs glikemijos kontrolės tikslai.

Pacientų grupių apibrėžimas	HbA1c tikslas
Naujai diagnozuotas CD turintiems antsvorio ar nutukusiems suaugusiems pacientams, nesant komplikacijų	< 6,5 %
Naujai diagnozuotas neturintis antsvorio suaugęs pacientas, nesant komplikacijų	6,5 – 7,0 %
Naujai diagnozuoti asmenys su mikro- ar makrokraujagyslinėmis kompliakacijomis	< 7,0 %
Asmenys, kurių glikemijos kontrolė anksčiau buvo neadekvati (nenutukę ar nutukę), nesant komplikacijų	6,5 – 7,0 %
Asmenys, kurių glikemijos kontrolė anksčiau buvo neadekvati (nenutukę ar nutukę), sergantys širdies ir kraujagyslių ligomis	7,0 – 8,5 %
Asmenys, kurių glikemijos kontrolė anksčiau buvo neadekvati (nenutukę ar nutukę), esant mikrokraujagyslinėms kompliakacijoms	6,5 – 7,0 %
Asmenys, kuriems yra padidėjusi hipoglikemijos rizika	7,0 – 8,5 %

J. Bailey, P. Aschner, S. Del Prato, J. LaSalle, L. Ji, S. Matthaai. Individualized glyceimic targets and pharmacotherapy in type 2 diabetes. Diabetes & Vascular Disease Research. 2013