

Firminis pavadinimas/tipas	Veikimo pradžia	Pikas	Trukmė	Kraujo gliukozės reguliavimas
Greitai veikiantys				
Humalog / lispro Humalog 200U / lispro	10-15 min.	60-120 min.	3,5-4,75 val.	Užtikrina insulino substituciją maistui, suvalgytam tuo pačiu metu kaip injekcija. Vartojamas su ilgiau veikiančiu insulinu.
NovoRapid / aspart	10-15 min.	60-90 min.	3-5 val.	
Apidra / glulisine	10-15 min.	60-90 min.	3-5 val.	
Fiasp / aspart	5 min.	60-120 min.	3-5 val.	
Trumpai veikiantys				
Regular / Humulin R	30 min.	2-3 val.	6,5 val.	Užtikrina insulino substituciją maistui, suvalgytam po 30-60 minučių.
Vidutinės veikimo trukmės				
Humulin N	1-3 val	5-8 val.	iki 18 val.	Užtikrina insulino substituciją apie pusę dienos ar per naktį. Dažnai derinamas su trumpo arba greito veikimo insulinu.
Ilgai veikiantys				
Lantus / glargine	90 min.	Nėra piko; Insulino koncentracija palaikoma pastoviu lygyje	iki 24 val.	Užtikrina insulino substituciją apie vieną dieną; jei reikia, derinamas su trumpo arba greito veikimo insulinu.
Abasaglar / glargine			iki 30 val	
Levemir / detemir				
Toujeo / glargine U300	iki 6 val		iki 42 val.	Pusiausvyrinė apykaita serume nusistovi po 2-3 dienų kasdienio vartojimo;
Tresiba/ degludec	Per pirmą parą iš paodžio absorbuojama pusė suleistos dozės	Nėra piko; lėtas ir pastovus insulino tiekimas į kraujotaką	iki 42 val.	
Mišiniai (Pre-Miksai)*				
NovoMix 70/30	10-20 min.	1-4 val.	iki 24 val.	Leidžiami prieš valgį.
Humalog Mix 50	30 min.	2-5 val.	18-24 val.	
Humalog Mix 25	15 min.	30 min.-2½ val.	16-20 val.	

*Insulino mišinys- specifinės proporcijos vidutinės trukmės ir greitai (trumpai) veikiančio insulino viename injektoriuje ar buteliuke mišinys; skaičiai nurodo procentinius insulino kiekius.

Visų insulinų charakteristikų santraukas galima rasti

<http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/alfregister.htm>