

PATIKRŲ DĖL DIABETINĖS RETINOPATIJOS (DR) ATLIKIMO REKOMENDACIJOS

Patikrų dėl DR atlikimo rekomendacijos
Kada atlikti pirmąją patikrą dėl DR?
<ul style="list-style-type: none">• 1 tipo CD sergantiesiems ≥ 15 metų asmenims praėjus 5 metams nuo diagnozės nustatymo.• Visiems iš karto diagnozavus 2 tipo CD.
Patikros metodika
<ul style="list-style-type: none">• 7 standartinių rodiklių stereoskopinė spalvinė akių dugno fotografija ir jos įvertinimas („aukso standartas“).• Tiesioginė oftalmoskopija ar netiesioginė fundoskopija plyšine lempa išplėtus paciento vyzdžius.• Skaitmeninė akių dugno fotografija.
Jeį nustatoma DR
<ul style="list-style-type: none">• Diagnozuoti retinopatijos sunkumą ir spręsti dėl kartotinio oftalmologinio ištyrimo dažnumo (rekomenduojami intervalai ≤ 1 metai).• Diagnozavus proliferacinę retinopatiją, taikyti panretinalinę lazerinę fotokoaguliaciją, farmakologinį ar chirurginį gydymą.• Įvertinti paciento glikemijos, kraujospūdžio, lipidų apykaitos kontrolę, esant reikalui, koreguoti gydymą.• Iširti dėl kitų CD komplikacijų.
Jeį DR nenustatoma
<ul style="list-style-type: none">• 1 tipo CD: tirti dėl DR kas metus.• 2 tipo CD: tirti dėl DR kas 1-2 metus.• Įvertinti paciento glikemijos, kraujospūdžio, lipidų apykaitos kontrolę, esant reikalui koreguoti gydymą.• Kartotinai tirti dėl kitų CD komplikacijų.