

## VAISTAI SIMPTOMINIAM DIABETINĖS POLINEUROPATIJOS GYDYMUI

Vaistas	Rekomenduojama pradinė dozė	Rekomenduojamas titravimas, jei pacientas vaistą toleruoja	Rekomenduojama maksimali dozė
Gabapentinas (prieštraukulinis vaistas)	300 mg p/os 2 k./d.	Titruoti palaipsniui iki 600 mg p/os 4 k./d.	3600 mg/d.
Pregabalinas (prieštraukulinis vaistas)	75 mg p/os 2 k./d.	Titruoti palaipsniui iki 300 mg 2 k./d.	600 mg/d.
Valproinė rūgštis (prieštraukulinis vaistas)	250 mg p/os 2 k./d.	Titruoti palaipsniui iki 500 mg p/os 2 k./d.	1500 mg/d.
Amitriptilinas (antidepresantas)	10 mg p/os nakčiai	Titruoti palaipsniui iki 100 mg p/os nakčiai	150 mg/d.
Duloksetinas (antidepresantas)	30 mg p/os 1 k./d.	Titruoti palaipsniui iki 60 mg p/os 1 k./d.	120 mg/d.
Venlafaksinas	37,5 mg p/os 2 k./d.	Titruoti palaipsniui iki 150 mg p/os 2 k./d.	300 mg/d.
Dekstrometorfanas (opioidinis analgetikas)	100 mg 4 k./d.	Titruoti palaipsniui iki 200 mg p/os 4 k./d.	960 mg/d.
Pailginto atpalaidavimo morfinas	15 mg 2 k./d.	Titruoti palaipsniui iki 60 mg 2 k./d.	180 mg/d.
Oksikodonas	10 mg 2 k./d.	Titruoti palaipsniui iki 40 mg p/os 2 k./d.	160 mg/d.
Tapentadolis	100 mg 2 k./d.	Titruoti palaipsniui iki 250 mg p/os 2 k./d.	500 mg/d.
Tramadolis	50 mg 4 k./d.	Titruoti palaipsniui iki 100 mg 4 k./d.	400 mg/d.
Vietinis nitratų purškiklis	30 mg purkšti ant kojų vakare	30 mg purkšti ant kojų 2 k./d.	60 mg/d.
Kapsaicino kremas	0,075 % kremą tepti ant kojų 3-4 k./d.	Esant reikalui, tepti 5-6 k./d.	5-6 įtepimai kremu per dieną.
Perodinė elektrinė nervų stimuliacija			